

PRINCIPAIS PATOLOGIAS ASSOCIADAS A PRÓTESE ODONTOLÓGICA EM IDOSOS

LAGE, Maria Emília Lage¹; **GRAPIUNA**, Juliana Dias Grapiuna²

¹Graduando do curso de Medicina, UNIFACIG, Manhuaçu - MG, e-mail

²Graduando do curso de Medicina, UNIFACIG, Manhuaçu - MG, e-mail

Palavras-chave: Prótese Dentária. Saúde Bucal de Idosos

INTRODUÇÃO

O Brasil possui um histórico odontológico onde a odontologia estava mais direcionada para o aspecto curativo, com procedimentos de baixa complexidade, o que por vezes acarretava em problemas na saúde bucal dos pacientes, onde se observava problemas na conservação dos dentes quando estes já apresentavam comprometimento (LUCENA *et al.*, 2011). Atualmente uma grande parcela da população brasileira é afetada pelo edentulismo, onde geralmente os principais afetados são os idosos, que por sua vez fazem uso de próteses totais ou removíveis (PINHO; MUNIZ; MELO, 2013). A prótese, seja removível ou total, é indicada para reabilitação oral do paciente em áreas edêntulas, afim de proporcionar função mastigatória, estética e fonética (CUNHA & RIBEIRO, 2019).

Estes pacientes que fazem uso de prótese devem ter instruções de higienização para assim melhorar a saúde oral. No entanto quando há uma má higienização, pode-se acarretar acúmulo de biofilme, o que por sua vez causa o desenvolvimento de fungos, desencadeando patologias como a estomatite protética. (DILL, 2018).

Quando há má adaptação da prótese na mucosa, ou quando ela se quebra eo paciente continua fazendo uso, estas podem gerar um traumatismo na cavidade oral, onde associado a má higienização, resultam em patologias. As principais patologias associadas cavidade oral e uso de próteses são as úlceras traumáticas, acandidíase que são alterações fúngicas, a estomatite protética, a queilite angular, por falta de dimensão vertical e a hiperplasia inflamatória. (PINHO; MUNIZ; MELO, 2013).

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, onde foi utilizada a base dedados SCIELO. De acordo com os descritores em ciências da saúde selecionados, foram encontrados cerca de 30 artigos relacionados na plataforma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estomatite protética é a principal lesão apresentada em pacientes que usam prótese odontológica, que é uma doença multifatorial onde os pacientes que apresentam deficiências nutricionais



e diabetes, por exemplo, quando associadas a condições locais desfavoráveis como acúmulo de placa bacteriana, próteses mal adaptadas e fungos, tendem a desenvolver a doença (PINHO; MUNIZ; MELO, 2013). Porém, de acordo com Araújo *et al.* (2020), mesmo a doença sendo multifatorial, a infecção por *candida albicans* é o principal fator para desencadear a doença.

Segundo Carli (2013), a úlcera traumática é uma lesão de mucosa comumente encontrada em pacientes que utilizam próteses odontológicas mucossuportadas devido a erros profissionais, onde geralmente são ocasionadas por traumas oclusais e próteses mal adaptadas. Em concordância, de com Cunha e Ribeiro, (2019) a Úlcera traumática é causada pelo acabamento inapropriado da prótese provocando uma elevação entre a prótese e a mucosa oral.

A Queilite Angular é uma doença atingida principalmente em pacientes idosos onde apresenta na comissura labial eritema, fissuração e descamação quando esses fazem uso de prótese e tem sua dimensão vertical reduzida fazendo com que a saliva se acumule nas comissuras labiais facilitando a proliferação do fungo da *Candida albicans*, assim se instalando a doença. (BARBOSA, 2018). De acordo com Rizental *et al.* (2018) é um dos aspectos da candidíase bucal formar um espessamento Branco acinzentado podendo evoluir para descamação fissura e até formação de crosta.

Segundo Carvalho (2017) a hiperplasia fibrosa é uma proliferação de tecido estimulado por fatores mecânicos e falta de higienização bucal, que geralmente está ligada a próteses mal adaptadas acometendo em grande maioria a região anterior e principalmente em mulheres. Todavia, Canger (2009) afirma que antigamente as próteses continham uma câmara a vácuo que era feita para retenção em próteses mucossuportadas, porém estas contribuíam para o crescimento de um tecido hiperplásico no local da câmara.

CONCLUSÃO

Conclui-se que as patologias associadas a próteses odontológicas são geralmente ligadas a uma má adaptação ou confecção das mesmas, onde associada à má higienização acarreta patologias bucais, principalmente em pacientes idosos. Sendo essas apontadas no presente estudo; úlceras traumáticas, a candidíase oral, a estomatite protética, a queilite angular e a hiperplasia inflamatória.



CARVALHO, F. R. et al. Hiperplasia fibrosa inflamatória-revista da literatura-relato decaso clínico cirúrgico. **Rev Odont**, v. 17, n. 4, p. 290-8, 2017.

CANGER, Emin Murat; CELENK, Peruze; KAYIPMAZ, Saadettin. Denture-related hyperplasia: a clinical study of a Turkish population group. **Brazilian dental journal**, v. 20, p. 243-248, 2009.